

Recientemente Van der Jagt y col de la Universidad de Ottawa publicaron un interesante artículo sobre las perspectivas de Bendamustina para el tratamiento de la LLC y los LnoHd en el volumen 19 de la revista Current Oncology.

Luego de revisar los objetivos del tratamiento en LLC destacando la importancia del tratamiento adecuado al riesgo y la necesidad de balancear la eficacia con la tolerancia y la calidad de vida, repasan los excelentes resultados de Bendamustina como monoterapia y en combinación en esta enfermedad tanto en primera línea como en pacientes recaídos. Como dato de interés comentan los resultados del estudio CLL2M del German CLL Study Group en el cual se incluyen pacientes con LLC vírgenes de tratamiento combinando Bendamustina con Rituximab. Este estudio cuyos resultados preliminares fueron presentados en ASH 2009 muestra casi 60% de respuestas con ERM negativa e incluso altos porcentajes de respuestas en los grupos de alto riesgo (del 17 e IGVH no M)

Así mismo realizan la misma tarea en los Linfomas no Hd y analizan también los estudios de fase II y III con diferentes combinaciones de Bendamustina en Linfoma Folicular indolente y de alto riesgo y en Linfoma de Células del Manto tanto en primera línea como en recaídos /refractarios.

Como la aprobación de Bendamustina en estas indicaciones aún está siendo evaluada por el Instituto de Salud de Canadá, manifiestan que esperan ansiosamente su aprobación para que los pacientes Canadienses con estos diagnósticos puedan beneficiarse con su utilización.

A Canadian perspective on bendamustine for the treatment of chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphoma. R.Van der Jagt, P.Laneuville, D.Mac Donald, D.Stewart, A Christofides and L.H. Sehn. Current Oncology (2012) Vol 19,N 3, 160-168.