

Canitib
Neratinib 40 mg
Comprimidos Recubiertos

Guía de tratamiento para el paciente/cuidador

**Información importante para minimizar el riesgo de eventos adversos relacionados con
Canitib (neratinib).**

**Este material no pretende reemplazar ninguna información que le haya proporcionado su
médico o cualquier profesional de la salud que esté involucrado en su tratamiento
oncológico.**

**Este material debe leerse junto con la Información para el Paciente que se puede encontrar
dentro de la caja de Canitib. La Información para el Paciente contiene información
adicional sobre los posibles efectos adversos de Canitib.**

¿Qué es Canitib y para que se utiliza?

Canitib se utiliza en pacientes con cáncer de mama en estadio inicial que: - tengan el receptor hormonal positivo (HR-positivo) y el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 positivo (HER2-positivo), y - hayan sido tratados previamente con otro medicamento llamado «trastuzumab».

Este material informativo contiene información importante para el uso seguro de Canitib. Es importante que lea y comprenda esta información antes de comenzar el tratamiento, ya que lo puede ayudar a reducir el riesgo de que ciertos riesgos ocurran.

Al leer cuidadosamente esta guía, aprenderá más sobre Canitib y algunos de sus posibles efectos adversos.

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Canitib?

Consulte a su médico antes de empezar a tomar Canitib.

Canitib puede causar diarrea al principio del tratamiento. La diarrea suele aparecer al principio del tratamiento con Canitib y puede ser intensa y provocar deshidratación. Su médico le indicará un medicamento antidiarreico para prevenir o reducir la diarrea y evitar que la misma sea grave.

- ✓ Empiece a tomar el medicamento contra la diarrea con la primera dosis de Canitib. Su médico le indicará cómo debe tomar el medicamento contra la diarrea.
- ✓ Siga tomando el antidiarreico durante el primer mes o los primeros dos meses de tratamiento con Canitib. Su médico le dirá si tiene que seguir tomándolo después de los dos primeros meses.

Su médico también le dirá si necesita cambiar la dosis de Canitib en caso de presentar diarrea.

Posibles eventos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Se pueden producir los siguientes efectos adversos con este medicamento:

Diarrea

Canitib puede causar diarrea al principio del tratamiento. La diarrea suele aparecer al principio del tratamiento con Canitib y puede ser intensa y provocar deshidratación. Su médico le indicará un medicamento antidiarreico para prevenir o reducir la diarrea y evitar que la misma sea grave-

En caso de presentar diarrea debe advertirle a su médico. Su médico podrá:

- ✓ Ajustar la dosis de Canitib si fuera necesario
- ✓ Sugerirle realizar cambios en la dieta
- ✓ Si la diarrea no desaparece; puede darle consejos para controlar la diarrea.

Advierta si se siente débil o mareado debido a la diarrea y acuda al hospital inmediatamente.

Informe a su médico tratante si usted presentara algún efecto adverso. Estos no son todos los posibles efectos adversos. Para más información consulte a su médico y la Información para el paciente.

Estomatitis

Canitib también puede producir muy frecuentemente (puede afectar a más de 1 de cada 10 personas) boca seca o inflamada, con ampollas o llagas en la boca. Informe a su médico si presentara algunos de estos eventos.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

También puede comunicarse con Laboratorio Varifarma mediante la página web:

<http://varifarma.com.ar/> o con el Programa de pacientes Vari te acerca: 0800-345-5624.

Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.